

◆ 投与スケジュール

| ◆1コース目 | 1 | 2 | ... | 14 | ... | 21 | (day) |
|--------------------------|---|---|-----|----|-----|----|-------|
| S-1 80~120mg/day, 分2(内服) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | |

1コース = 3週間(2週投与1週休薬)

| ◆2~7コース目 | 1 | 2 | ... | 14 | ... | 21 | (day) |
|--------------------------|---|---|-----|----|-----|----|-------|
| S-1 80~120mg/day, 分2(内服) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | |

タキソテール 40mg/m², 60分

1コース = 3週間(2週投与1週休薬)

| ◆8~12コース目(1コース開始より1年間) | 1 | 2 | ... | 28 | ... | 42 | (day) |
|--------------------------|---|---|-----|----|-----|----|-------|
| S-1 80~120mg/day, 分2(内服) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | |

1コース = 6週間(4週投与2週休薬)

| Day | 薬品 | 投与量 |
|-------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 1日目 | |
| | 生理食塩液PL「フソー」100mL(ボトル) | 1 瓶 |
| | オルガトロン注射液3.8mg 1mL | 2 管 |
| | プロイメント点滴静注用150mg | 1 瓶 |
| | 生理食塩液PL「フソー」100mL(ボトル) | 1 瓶 |
| | アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg | 1 袋 |
| | ■タキソテール点滴静注用80mg 2mL | 40 mg/m ² |
| 大塚生食注 250mL | 1 袋 | |