

◆ 投与スケジュール

	1	8	21	(day)
イリノテカン 75mg/m ² , 90分	↓			↓				
ゲムシタビン 1,000mg/m ² , 30分	↓			↓				
フルオロウラシル 2,000mg/m ² , 24時間	→			→	→	→		

1コース=3週間(2投1休)

Day	薬品	投与量
1	1日目	
	生理食塩液100mL	1 瓶
	プロイメント点滴静注用150mg	1 瓶
	オルカドロン注射液3.8mg 1mL	3 管
	生理食塩液100mL	1 瓶
	アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1 袋
	■イリノテカン塩酸塩点滴静注「タイホウ」 (40mg/100mg)	75 mg/m ²
	大塚糖液5% 250mL	1 瓶
	■ゲムシタビン点滴静注液「NK」 (200mg/1g)	1000 mg/m ²
	生理食塩液50mL	1 瓶
	中心静脈内注射 (IVH) 埋込型 / div ■5-FU注 (250mg/1g)	2000 mg/m ²
	大塚生食注 500mL	2 袋
8	8日目	
	生理食塩液100mL	1 瓶
	プロイメント点滴静注用150mg	1 瓶
	オルカドロン注射液3.8mg 1mL	3 管
	生理食塩液100mL	1 瓶
	中心静脈内注射 (IVH) 埋込型 / div アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1 袋
	1日1回 未選択 日付指定 ■イリノテカン塩酸塩点滴静注「タイホウ」 (40mg/100mg)	75 mg/m ²
	大塚糖液5% 250mL	1 瓶
	■ゲムシタビン点滴静注液「NK」 (200mg/1g)	1000 mg/m ²
	生理食塩液50mL	1 瓶
	■フルオロウラシル注「ト-ワ」(250mg/1g)	2000 mg/m ²