

FOLFIRI+ザルトラップ【大腸がん】

◆ 投与スケジュール

	1	2	…	…	14	(day)
ザルトラップ 4mg/kg, 1時間	↓					
イリノテカン 150mg/m ² , 2時間	↓					
レボホリナート 200mg/m ² , 2時間	↓					
フルオロウラシル 400mg/m ² , 急速静注	↓					
フルオロウラシル 2,400mg/m ² , 持続静注46時間		→				

1コース = 2週間

Day	薬品	投与量
	1日目	
	生理食塩液100mL	1 瓶
	プロイメント点滴静注用150mg	1 瓶
	オルガドロン注射液3.8mg 1mL	2 管
	生理食塩液100mL	1 瓶
	アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1 袋
	■ザルトラップ点滴静注(100mg /200mg)	4 mg/kg
	生理食塩液100mL	1 瓶
1	■イリノテカン塩酸塩点滴静注「タイホウ」 (40mg／100mg)	150 mg/m ²
	大塚糖液5% 250mL	1 瓶
	■レボホリナート (25mg/100mg)	200 mg/m ²
	大塚糖液5% 250mL	1 瓶
	■フルオロウラシル注「トーウ」(250mg／1g)	400 mg/m ²
	生理食塩液50mL	1 瓶
	■フルオロウラシル注「トーウ」(250mg／1g)	2400 mg/m ²
	生理食塩液50mL	50 mL