

◆ 投与スケジュール

| | 1 | 2 | ... | ... | 14 (day) |
|--|---|---|-----|-----|----------|
| サイラムザ 8mg/kg, 1時間 | ↓ | | | | |
| イリノテカン 150mg/m ² , 2時間 | ↓ | | | | |
| レボホリナート 200mg/m ² , 2時間 | ↓ | | | | |
| フルオロウラシル 400mg/m ² , 急速静注 | ↓ | | | | |
| フルオロウラシル 2,400mg/m ² , 持続静注46時間 | → | | | | |
| 1コース = 2週間 | | | | | |

| Day | 薬品 | 投与量 |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1 | 1日目 | |
| | 生理食塩液 100mL | 1 瓶 |
| | フロイメント点滴静注用150mg | 1 瓶 |
| | オルカトロン注射液3.8mg 1mL | 2 管 |
| | ホラミン注5mg 0.5%1mL | 1 管 |
| | 生理食塩液 100mL | 1 瓶 |
| | アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg | 1 袋 |
| | ■サイラムザ点滴静注液(100mg /500mg) | 8 mg/kg |
| | 大塚生食注 250mL | 1 瓶 |
| | ■イリノテカン塩酸塩点滴静注「タイホウ」(40mg/100mg) | 150 mg/m ² |
| | 大塚糖液5% 250mL | 1 瓶 |
| | ■レボホリナート(25mg/100mg) | 200 mg/m ² |
| | 大塚糖液5% 250mL | 1 瓶 |
| | ■フルオロウラシル注「トーワ」(250mg/1g) | 400 mg/m ² |
| | 生理食塩液50mL | 1 瓶 |
| | 1日1回 未選択 日付指定 | |
| ■フルオロウラシル注「トーワ」(250mg/1g) | 2400 mg/m ² | |
| 生理食塩液50mL | 50 mL | |