

◆ 投与スケジュール

|  | 1 | 2 | ... | ... | 14 | (day) |
|--|---|---|-----|-----|----|-------|
| アバスタチン 5mg/kg, 90~30分                      | ↓ |   |     |     |    |       |
| オキサリプラチン 85mg/m <sup>2</sup> , 2時間         | ↓ |   |     |     |    |       |
| レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> , 2時間         | ↓ |   |     |     |    |       |
| フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> , 急速静注       | ↓ |   |     |     |    |       |
| フルオロウラシル 2,400mg/m <sup>2</sup> , 持続静注46時間 | → |   |     |     |    |       |

1コース = 2週間

| Day                       | 薬品                                 | 投与量                   |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1                         | <b>1日目</b>                         |                       |
|                           | プロイメント点滴静注用150mg                   | 1 瓶                   |
|                           | オルカドロン注射液3.8mg 1mL                 | 2 管                   |
|                           | アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg                 | 1 袋                   |
|                           | ■アバスタチン点滴静注用(100mg/400mg)          | 5 mg/kg               |
|                           | ■オキサリプラチン点滴静注液「NK」<br>(50mg/100mg) | 85 mg/m <sup>2</sup>  |
|                           | 大塚糖液5% 250mL                       | 1 瓶                   |
|                           | ■レボホリナート(25mg/100mg)               | 200 mg/m <sup>2</sup> |
|                           | 大塚糖液5% 250mL                       | 1 瓶                   |
|                           | ■フルオロウラシル注「トーワ」(250mg/1g)          | 400 mg/m <sup>2</sup> |
| ■フルオロウラシル注「トーワ」(250mg/1g) | 2400 mg/m <sup>2</sup>             |                       |