

## ◆ 投与スケジュール

|  | 1 | 2 | ... | ... | 14 | (day) |
|--|---|---|-----|-----|----|-------|
| ベクティビックス 6mg/kg, 1時間                       | ↓ |   |     |     |    |       |
| レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> , 2時間         | ↓ |   |     |     |    |       |
| フルオロウラシル 400mg/m <sup>2</sup> , 急速静注       | ↓ |   |     |     |    |       |
| フルオロウラシル 2,400mg/m <sup>2</sup> , 持続静注46時間 | → |   |     |     |    |       |

1コース = 2週間

| Day                   | 薬品                        | 投与量                    |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 1                     | <b>1日目</b>                |                        |
|                       | 生理食塩液100mL                | 1 瓶                    |
|                       | フロイメント点滴静注用150mg          | 1 瓶                    |
|                       | オルカトロン注射液3.8mg 1mL        | 2 管                    |
|                       | 生理食塩液100mL                | 1 瓶                    |
|                       | アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg        | 1 袋                    |
|                       | ■ベクティビックス点滴静注100mg 5mL    | 6 mg/kg                |
|                       | 生理食塩液100mL                | 1 瓶                    |
|                       | ■レボホリナート (25mg/100mg)     | 200 mg/m <sup>2</sup>  |
|                       | 大塚糖液5% 250mL              | 1 瓶                    |
|                       | ■フルオロウラシル注「トーワ」(250mg/1g) | 400 mg/m <sup>2</sup>  |
|                       | 生理食塩液PL「フソー」50mL(ボトル)     | 1 瓶                    |
|                       | ■フルオロウラシル注「トーワ」(250mg/1g) | 2400 mg/m <sup>2</sup> |
| 生理食塩液PL「フソー」50mL(ボトル) | 50 mL                     |                        |