## ◆ 投与スケジュール

	1	2	3	4	5	 	42	(day)
フルオロウラシル 400mg/㎡, 30分	Ţ	1	Ţ	Ţ	1			
ザノサー 500mg/m², 30分	Ţ	ļ	Ţ	ļ	1			

1コース=6週間

生。 生。 オル プロ 生。 生。 中。 生。 中。 生。	# 目 理食塩液500mL 理食塩液500mL 理食塩液500mL か 「 ロン注射液3.8mg 1mL I/ソント点流静注用150mg 理食塩液100mL キシ点流静注パッグ 0.75mg アルオロウランル注「トーフ」(250mg/理食塩液100mL	1 3 1 1 1 400	袋 袋 管 瓶 瓶 袋 mg/m <sup>d</sup>
生: オルフェ 生: 日 ロ: 生: 中: 生:	理食塩液500mL カトロン注射液3.8mg 1mL パメント、点滴静注用150mg 理食塩液100mL キシ点滴静注パック・0.75mg アルオロウラシル注「トーワ」(250mg/ 理食塩液100mL 心静脈内注射(IVH)埋込型 理食塩液50mL	1 3 1 1 1 400	袋 管 瓶 瓶 袋
カルフェータ カルフェータ カルフェータ 1 ■ 1 単 1 生 3 中 1 単 5 単 5 単 5 単 5 サード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	が「ロン注射液3.8mg 1mL Iイメント、点滴静注用150mg 理食塩液100mL キシ点滴静注ハ、ック・0.75mg フルオロウラシル注「トーワ」(250mg/ 理食塩液100mL 心静脈内注射(IVH)埋込型 理食塩液50mL	3 1 1 1 400	管 瓶 瓶 袋
7°° (±3) 7°° (±3) 7°° (±3) 1 (±3) (±4) (±4)	Iイメント・点滴静注用150mg 理食塩液100mL キシ点滴静注パッグ 0.75mg アルカロウラシル注「トーワ」(250mg/ 理食塩液100mL 心静脈内注射(IVH)埋込型 理食塩液50mL	1 1 1 400	瓶 瓶 袋
1 1 生 生 中, 生 3	理食塩液100mL キシ点滴静注パッグ 0.75mg アルオロウラシル注「トーワ」(250mg/ 理食塩液100mL 心静脈内注射(IVH)埋込型 理食塩液50mL	1 1 400	瓶 袋
1 70 量: 生3 中; 生3	キシ点滴静注パッグ 0.75mg 7ルオロウラシル注「トーワ」(250mg/ 理食塩液100mL 心静脈内注射(IVH)埋込型 理食塩液50mL	1 400	袋
* <u>量</u> ; 生; 中, 生;	7ルオロウラシル注「トーワ」(250mg/ 理食塩液100mL 心静脈内注射(IVH)埋込型 理食塩液50mL	400	
生3 中/ 生3 生3	理食塩液100mL 心静脈内注射(IVH)埋込型 理食塩液50mL		mg/ <b>m</b> i
中/ 生3 ■- 生3	心静脈内注射(IVH)埋込型 理食塩液50mL	1	
生 <sup>3</sup> 量-	理食塩液50mL		瓶
生3			
生3		1	瓶
	ザノサー点滴静注用 1g	500	mg∕ <b>m</b> i̇́
or.	理食塩液100mL	1	瓶
Z	1目		
生	理食塩液500mL	1	袋
生	理食塩液500mL	1	袋
オル	カドロン注射液3.8mg 1mL	3	管
	バメント、点滴静注用150mg		瓶
	理食塩液100mL		瓶
	キシ点滴静注バッグ 0.75mg		袋
	フルオロウラシル注「トーワ」(250mg/	400	mg/m <sup>2</sup>
	理食塩液100mL		瓶
生!	理食塩液50mL	1	瓶
	ザノサー点滴静注用 1g	500	mg/m <sup>2</sup>
生 生	理食塩液100mL	1	瓶
3E	1目		
	理食塩液500mL	1	袋
生	理食塩液500mL		袋
オル	カドロン注射液3.8mg 1mL	3	管
プロ	バメント゛点滴静注用150mg	1	瓶
	理食塩液100mL	1	瓶
	キシ点滴静注バッグ 0.75mg		袋
	フルオロウラシル注「トーワ」(250mg/	400	mg/ <b>m</b> i
	理食塩液100mL	1	瓶
	理食塩液50mL		瓶
<b>I</b>	ザノサー点滴静注用 1g	500	mg/ <b>m</b> i
生 生	理食塩液100mL	1	瓶
4E	- —		
	理食塩液500mL		袋
	理食塩液500mL		袋
·  オル	カート・ロン注射液3.8mg 1mL		管
	バメント、点滴静注用150mg		瓶
	理食塩液100mL		瓶
	キシ点滴静注バック 0.75mg		袋
	フルオロウラシル注「トーワ」(250mg/		mg/m²
	理食塩液100mL		瓶
	理食塩液50mL	1	瓶
1 1.	ザノサー点滴静注用 1g		mg/m <sup>2</sup>
	理食塩液100mL 	1	瓶
	] <b>目</b> 阻食拘液500ml	1	袋
	理食塩液500mL 理食塩液500mL		袋
	座長塩液500mL がドロン注射液3.8mg 1mL		管
	が トロン注射 及3.6mg TML Iイメント・点滴静注用150mg		瓶
	ロスター		瓶
	年及塩液100mL キシ点滴静注バッグ 0.75mg		袋
	イン 点 荷 野 注 バック 0.75mg フルオロウラシル注「トーワ」(250mg/		ax mg∕m <sup>†</sup>
	理食塩液100mL		瓶
	壁食塩液100mL 理食塩液50mL		瓶
	年長塩水の間と ザノサー点滴静注用 1g		mg/m <sup>d</sup>
生	理食塩液100mL	1	瓶