

◆ 投与スケジュール

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|---|-----|----|-----|----|-----|----|-------|
| | 1 | ... | 8 | ... | 15 | ... | 22 | ... | 28 | (day) |
| アブラキサン 125mg/m ² , 30分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | |
| ゲムシタビン 1,000mg/m ² , 30分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | |

1コース = 4週間(3投1休)

| Day | 薬品 | 投与量 |
|-----|--------------------------------|------------------------|
| 1 | 1日目 | |
| | 生理食塩液 100mL | 1 瓶 |
| | アロキン点滴静注バッグ 0.75mg | 1 袋 |
| | オルカドロン注射液3.8mg 1mL | 2 管 |
| | ■アブラキサン点滴静注用100mg | 125 mg/m ² |
| | 生理食塩液 100mL | 1 瓶 |
| | 生理食塩液50mL | 1 瓶 |
| | 生理食塩液100mL | 1 瓶 |
| 8 | ■ゲムシタビン点滴静注液「NK」 (200mg/1g) | 1000 mg/m ² |
| | 8日目 | |
| | 生理食塩液 100mL | 1 瓶 |
| | アロキン点滴静注バッグ 0.75mg | 1 袋 |
| | オルカドロン注射液3.8mg 1mL | 2 管 |
| | ■アブラキサン点滴静注用100mg | 125 mg/m ² |
| | 生理食塩液100mL | 1 瓶 |
| | 生理食塩液 50mL | 1 瓶 |
| 15 | 生理食塩液100mL | 1 瓶 |
| | アロキン点滴静注バッグ 0.75mg | 1 袋 |
| | オルカドロン注射液3.8mg 1mL | 2 管 |
| | ■アブラキサン点滴静注用100mg | 125 mg/m ² |
| | 生理食塩液100mL | 1 瓶 |
| | 生理食塩液 50mL | 1 瓶 |
| | 生理食塩液100mL | 1 瓶 |
| | ■ゲムシタビン点滴静注液「NK」 (200mg/1g) | 1000 mg/m ² |